

参考資料 1

聖路加予防医療センターで健康診断を受けられた方へ

先日の健康診断時にご協力頂きました、関節リウマチの発症を予測する検査の結果が**陽性**でした。

血液検査が陽性の場合でも、関節リウマチを発症されない方も多くいらっしゃいますが、早期の症状に気づいていない方も少なくありません。病気の早期発見・早期治療のために早めに聖路加国際病院アレルギー膠原病科をご受診頂き医師の診察を受けて頂くことをお勧めいたします。

実際に受診されるかどうかは、みなさんのご意思ですが、受診していただけた際には、診察のうえ、「関節リウマチ」を発症している方には、通常の治療をご説明しお勧めします。発症されていない方にも、今後の可能性として発症した際に自覚されることの多い症状のご説明などをさせていただきます。早期にリウマチ医を受診して頂き診断・治療を可能にすることで、遅れて発見されるよりも病気の進行を抑えることができると考えております。

ご受診に関しては下記までお問い合わせ頂き、アレルギー膠原病科に予約をとって頂き聖路加国際病院をご受診ください。

聖路加国際病院 予約センター

03-5550-7120


予約センターがつながりにくい際は

聖路加国際病院 代表番号 **03-3541-5151**

交換手を介してアレルギー膠原病科外来受付までお電話下さい。


聖路加国際病院 アレルギー膠原病科 (SLE・関節リウマチ・小児リウマチ)

参考資料 2




参考資料 3

RF スクリーニング研究結果(2008-2012)



参考資料 4

2013・2014年度 集計結果



參考資料 5

单变量解析

変数	CCP陽性群	CCP陰性群	P value
年齢	56.5	51.1	0.00
RF titer	52.0	11.0	0.00
RF陽性(n,(%))	98 (63.6%)	1173(10.1%)	0.00
CRP	0.21	0.08	0.06
BMI	21.3	21.2	0.74
悪性腫瘍(n,(%))	22 (14.3%)	1181 (11.3%)	0.10
糖尿病(n,(%))	1 (0.64%)	285 (24.5%)	0.19
高血圧(n,(%))	21 (13.6%)	1054 (9.1%)	0.07
高脂血症(n,(%))	18 (11.7%)	1197 (10.3%)	0.60
脳卒中(n,(%))	1 (0.6%)	75 (0.6%)	1.00
甲状腺疾患(n,(%))	11 (7.1%)	912 (7.9%)	0.88
肝炎(n,(%))	3 (1.9%)	108 (0.9%)	0.18
心血管疾患(n,(%))	2 (1.3%)	72 (0.6%)	0.25
喫煙(n,(%))	21 (13.6%)	2074(17.9%)	0.21

Chi-squared test

多变量解析

変数	Odds ratio	95%CI	P value
年齢	1.03	1.02-1.04	0.00
RF陽性	14.51	10.36-20.31	0.00

Logistic regression analysis

参考資料 6

	RF+CCP-	RF+CCP+	RF-CCP+
総数	1173	98	56
受診者数	109	26	20
RA診断例	1	6	1
RA/総数	0.09%	6.1%	1.8%
RA/受診者	0.92%	23.1%	5%

参考資料 7

	年齢	観察期間 (月)	RF	RF (U/mL)	ACPA	ACPA (U/mL)	診断時 SDAI	最終時 SDAI	治療
①	46	8	+	27	+	207	6	0	IA → Drug Free
②	68	1	+	27	-	>0.6	21	N/A ※	
③	45	5	+	35	+	122	6.59	2.05	SASP, BUC
④	51	9	+	18	+	322	10.53	1	IGR
⑤	51	9	+	26	+	117	8.21	5	SASP
⑥	51	8	+	19	+	14.2	21	0	MTX
⑦	65	8	-	6	+	10.3	3.73	0	IA, SASP → MTX → Drug free
⑧	70	9	+	31	+	43.9	7.55	0	BUC, SASP

※ 初回治療開始後、他院へ転院。