

【レジメン一覧:食道がん】

(更新日:2024/3)

レジメン番号	レジメン名称	薬剤名(一般名)	投与経路	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク
GE-005	Tri-weeklyトセタキセル療法	トセタキセル	点滴	70mg/m ²	Day1	21~28日	軽度
GE-009	Weeklyハクリタキセル療法	ハクリタキセル	点滴	100mg/m ²	Day1、8、15、22、29、36	49日	軽度
GE-013	ニホルマブ療法(2週毎)	ニホルマブ	点滴	240mg/body	Day1	14日	最小度
GE-014	ニホルマブ療法(4週毎)	ニホルマブ	点滴	480mg/body	Day1	28日	最小度
GE-017	ニホルマブ(2週毎)+イビリムマブ療法	ニホルマブ	点滴	240mg/body	Day1、15、29	42日	最小度
		イビリムマブ		1mg/kg	Day1		
GE-018	ニホルマブ(3週毎)+イビリムマブ療法	ニホルマブ	点滴	360mg/body	Day1、22	42日	最小度
		イビリムマブ		1mg/kg	Day1		
GE-021	ニホルマブ療法(2週毎)(術後補助)	ニホルマブ	点滴	240mg/body	Day1	14日	最小度
GE-022	ニホルマブ療法(4週毎)(術後補助)	ニホルマブ	点滴	480mg/body	Day1	28日	最小度

催吐性リスク:制吐薬適正使用ガイドライン第3版参照