

【レジメン一覧：胃がん】

(更新日:2024/3)

| レジメン番号 | レジメン名称 | 薬剤名(一般名) | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 投与間隔 | 催吐性リスク |
|--------|-------------------------------------|-----------------|------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|
| GS-017 | Bi-weeklyイリリテカン療法 | イリリテカン | 点滴 | 150mg/m ² | Day1、15 | 28日 | 中等度 |
| GS-020 | Tri-weeklyトラスツスマブ+カペシタビン+シスプラチン療法 | トラスツスマブ | 点滴 | (初回)8mg/kg (2回目以降)6mg/kg | Day1 | 21日 | 高度 |
| | | シスプラチン | | 80mg/m ² | | | |
| | | カペシタビン | 経口 | 2000mg/m ² /日 | Day1-14 | | |
| GS-024 | Tri-weeklyトラスツスマブ+S-1+シスプラチン療法 | トラスツスマブ | 点滴 | (初回)8mg/kg (2回目以降)6mg/kg | Day1 | 21日 | 高度 |
| | | シスプラチン | | 60mg/m ² | | | |
| | | S-1 | 経口 | 80mg/m ² /日 | Day1-14 | | |
| GS-028 | SOX療法 | オキサリプラチン | 点滴 | 130mg/m ² | Day1 | 21日 | 中等度 |
| | | S-1 | 経口 | 80mg/m ² /日 | Day1-14 | | |
| GS-030 | ラムシルマブ+Weeklyハクリタキセル療法 | ラムシルマブ | 点滴 | 8mg/kg | Day1、15 | 28日 | 軽度 |
| | | ハクリタキセル | | 80mg/m ² | Day1、8、15 | | |
| GS-032 | XELOX療法 | オキサリプラチン | 点滴 | 130mg/m ² | Day1 | 21日 | 中等度 |
| | | カペシタビン | 経口 | 2000mg/m ² /日 | Day1-14 | | |
| GS-033 | ニボルマブ療法(2週毎) | ニボルマブ | 点滴 | 240mg/body | Day1 | 14日 | 最小度 |
| GS-034 | Tri-weeklyトラスツスマブ+カペシタビン+オキサリプラチン療法 | トラスツスマブ | 点滴 | (初回)8mg/kg (2回目以降)6mg/kg | Day1 | 21日 | 中等度 |
| | | オキサリプラチン | | 130mg/m ² | | | |
| | | カペシタビン | 経口 | 2000mg/m ² /日 | Day1-14 | | |
| GS-035 | Weeklyアルブミン懸濁型ハクリタキセル療法 | アルブミン懸濁型ハクリタキセル | 点滴 | 100mg/m ² | Day1、8、15 | 28日 | 軽度 |
| GS-036 | ラムシルマブ+Weeklyアルブミン懸濁型ハクリタキセル療法 | ラムシルマブ | 点滴 | 8mg/kg | Day1、15 | 28日 | 軽度 |
| | | アルブミン懸濁型ハクリタキセル | | 100mg/m ² | Day1、8、15 | | |
| GS-037 | FOLFOX6療法 | オキサリプラチン | 点滴 | 85mg/m ² | Day1 | 14日 | 中等度 |
| | | レボホリナートCa | | 200mg/m ² | | | |
| | | フルオロウラシル | | 400mg/m ² | | | |
| | | フルオロウラシル | 持続点滴 | 2400mg/m ² | Day1-3 | | |
| GS-038 | S-1+ドセタキセル療法 | ドセタキセル | 点滴 | 40mg/m ² | (2~7コース)Day1 | (1~7コース)21日 (8コース以降)42日 | 軽度 |
| | | S-1 | 経口 | 80mg/m ² /日 | (1~7コース)Day1-14 (8コース以降)Day1-28 | | |
| GS-039 | ニボルマブ療法(4週毎) | ニボルマブ | 点滴 | 480mg/body | Day1 | 28日 | 最小度 |
| GS-040 | トラスツスマブ テルクステカン療法 | トラスツスマブ テルクステカン | 点滴 | 6.4mg/kg | Day1 | 21日 | 中等度 |
| GS-042 | ニボルマブ+XELOX療法 | ニボルマブ | 点滴 | 360mg/body | Day1 | 21日 | 中等度 |
| | | オキサリプラチン | | 130mg/m ² | | | |
| | | カペシタビン | 経口 | 2000mg/m ² /日 | Day1-14 | | |
| GS-043 | ニボルマブ+SOX療法 | ニボルマブ | 点滴 | 360mg/body | Day1 | 21日 | 中等度 |
| | | オキサリプラチン | | 130mg/m ² | | | |
| | | S-1 | 経口 | 80mg/m ² /日 | Day1-14 | | |
| GS-044 | ニボルマブ+FOLFOX療法 | ニボルマブ | 点滴 | 240mg/body | Day1 | 14日 | 中等度 |
| | | レボホリナートCa | | 200mg/m ² | | | |
| | | オキサリプラチン | | 85mg/m ² | | | |
| | | フルオロウラシル | | 400mg/m ² | | | |
| | | フルオロウラシル | 持続点滴 | 2400mg/m ² | Day1-3 | | |

催吐性リスク: 制吐薬適正使用ガイドライン第3版参照